

Dépistage de la dénutrition chez l'adulte hospitalisé en CS ou SSR

Niveau 1
J1

→ IMC $\leq 18,5$ *
 et / ou → Perte de Poids :
 2% en 1 semaine
 5% en 1 mois
 10% en 6 mois

Personnels concernés:
 → aide soignants
 → infirmiers
 → diététiciens
 → médecins

Les flèches jaunes indiquent l'action

Niveau 2
J2

STOP
poids 1x / s

NON

OUI

N.R.I. : Index de Buzby $(1,519 \times \text{albuminémie g/l} + 0,417 (\text{poids actuel/poids usuel} \times 100))$ *

Niveau 3

STOP
- poids 1x / s
- Surveillance alimentaire

> 97,5
Pas de dénutrition

83,5 à 97,5
dénutrition modérée

< 83,5
dénutrition sévère

Facteurs aggravants
 - Ingesta insuffisants
 - Terrain, douleur
 - Pathologies agressives
 - Durée d'hospitalisation

Intervention diététique
 Calcul des ingesta

Suppléments ± N.A.
 Mobiliser le patient
 Pesée hebdomadaire

Discussion N.A.
 Intervention de l'équipe de nutrition :
 PH et diététicien
 N.A. dans le respect de l'éthique

* Utilisation du Nutrimètre® NA = Nutrition artificielle